

	Tamoxifène	Antiaromatases (letrozole, anastrozole, exemestane)	Fulvestrant
Indication	Femmes ou hommes présentant un cancer du sein avec récepteurs aux hormones positifs avant ou après la ménopause <ul style="list-style-type: none"> - Adjuvant - Néo-adjuvant - En cas de rechute de la maladie 	Femmes présentant un cancer du sein avec récepteurs aux hormones positifs, après la ménopause seulement <ul style="list-style-type: none"> - Adjuvant - Néo-adjuvant - En cas de rechute de la maladie 	Femmes présentant un cancer du sein avec récepteurs hormonaux positifs après la ménopause seulement <ul style="list-style-type: none"> - En situation de rechute seulement
Posologie	1 comprimé à 20 mg par jour	1 comprimé par jour	Injections intra-musculaires 500 mg J1 J15 J29 puis tous les 28 J
Recommandations	<ul style="list-style-type: none"> - Examen gynécologique obligatoire avant traitement, surveillance gynécologique annuelle ensuite également - Echo pelvienne en surveillance : optionnelle - Contraception efficace en cours, non hormonale, chez les femmes non ménopausées - en cas de pertes de sang en dehors des règles, une consultation gynécologique s'impose ainsi qu'une hystéroscopie 	<ul style="list-style-type: none"> - Ménopause certaine - Ostéodensitométrie de référence puis à surveiller tous les deux ans (si besoin traitement associé de calcium, Vit D, voire bisphosphonates selon les résultats) - Suivi annuel du Cholestérol 	<ul style="list-style-type: none"> - Ménopause certaine
Contre-indications majeures	<ul style="list-style-type: none"> - Grossesse et allaitement - Galactosémie congénitale 	<ul style="list-style-type: none"> - Grossesse et allaitement 	<ul style="list-style-type: none"> - Grossesse et allaitement
Contre-indications relatives	<ul style="list-style-type: none"> - Hyperplasie endométriale pré-existante - Antécédent de thrombose profonde ou embolie pulmonaire - Rétinopathies, cataractes 	<ul style="list-style-type: none"> - antécédents vasculaires : indication à mesurer 	<ul style="list-style-type: none"> - antécédent de thrombophlébite - patiente sous anticoagulants à dose efficace (attention aux injections intra-musculaires)
Effets secondaires les plus fréquents	<ul style="list-style-type: none"> - Anomalies bénignes de l'endomètre (partie interne de l'utérus)(atrophie, hypertrophie) avec risque très faible mais réel de cancer de l'endomètre - Bouffées de chaleur - Pertes blanches - Nausées rares (prendre en 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Douleurs musculaires et articulaires +++ très fréquentes avec dérouillage matinal ou après immobilité, tendinites, exacerbation de syndrome du canal carpien - Bouffées de chaleur - Sécheresse gynécologique - Troubles digestifs très rares à type de 	<ul style="list-style-type: none"> - Douleurs articulaires : un peu - Diarrhée parfois - Sécheresse gynécologique - Fatigue - Hématome/douleur au point d'injection - Thrombophlébites (peu fréquentes)

-
- prises/j)
 - Disparition des règles ou cycles irréguliers chez les femmes non ménopausées.
 - Cataractes (1% de risque sur 5 ans), modifications cornéennes, rétinopathies (rares)
 - Douleurs articulaires : un peu
 - **Prise de poids** assez fréquente
 - **Thrombose profondes (phlébites) et embolies pulmonaires** : en cas d'intervention chirurgicale, d'immobilisation, ou de long voyage en avion, une anti-coagulation préventive et/ou l'arrêt très transitoire du médicament sont recommandés. En parler avec votre médecin.
 - nausées ou maux de ventre
 - Modifications des enzymes hépatiques sur la prise de sang
 - élévation du cholestérol
 - **Risque de déminéralisation osseuse et ostéoporose**
 - Eruptions cutanées très rares en début de traitement
 - Insomnies ou hypersomnie
 - Fatigue
 - Pertes de mémoire (discuté ?)
 - Déminéralisation osseuse
-